

**COMPORTAMIENTO POSTCOSECHA DE FRUTOS DE ILAMA (*Annona diversifolia*) EN MADUREZ COMESTIBLE ALMACENADOS EN ATMÓSFERA MODIFICADA**

**POSTHARVEST BEHAVIOR OF ILAMA (*Annona diversifolia*) FRUITS AT EDIBLE MATURITY STORED IN A MODIFIED ATMOSPHERE**

**Salvador Valle-Guadarrama<sup>1\*</sup>, Xóchitl G.Ruiz-Sánchez<sup>1</sup>, Crescenciano Saucedo-Veloz<sup>2</sup>, Adalberto Gómez-Cruz<sup>1</sup> y Lila M. Marroquín-Andrade<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Departamento de Ingeniería Agroindustrial y <sup>3</sup>Departamento de Fitotecnia, Universidad Autónoma Chapingo (UACh). Carr. México-Texcoco km 38.5, 56230, Chapingo, Edo. de México, México. <sup>2</sup>Fruticultura, Colegio de Postgraduados, Carr. México-Texcoco km 36.5, 56230, México, México.

\*Autor para correspondencia (svalleg@taurus.chapingo.mx)

**RESUMEN**

El fruto de ilama o papausa (*Annona diversifolia* Saff.) tiene potencial alto de comercialización, pero esto se limita porque su vida de anaquel es muy corta, porque los productores lo cosechan cuando llega a madurez comestible, y porque se desconoce su respuesta al uso de tecnologías para aumentar la vida útil. El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto del uso de atmósferas modificadas (AM) en la calidad postcosecha de frutos de ilama en madurez de consumo almacenados a 20 °C. Se realizaron almacenamientos durante 9 d en atmósfera de aire natural (AN) y en AM con polietileno de baja densidad de 33 µm de espesor. Los frutos de AM tuvieron 91 % menos pérdida de peso y mayores valores de firmeza (1.2 N), en comparación con los de AN. La respiración fue de 97.1 mL kg<sup>-1</sup> h<sup>-1</sup>, sin diferencia entre tratamientos. Tampoco hubo diferencia en contenido de acidez, sólidos solubles totales y azúcares totales, cuyos valores promedio fueron de 0.20 %, 17.9 °Brix y 17.6 %, respectivamente. Sin embargo, el contenido de azúcares reductores, que varió entre 4 y 10 %, fue mayor en el material manejado en AM. La atmósfera modificada probó ser útil para reducir las velocidades de pérdida de peso y ablandamiento, lo que puede permitir un tiempo de manejo postcosecha mayor de los frutos de ilama.

**Palabras clave:** *Annona diversifolia*, papausa, atmósferas modificadas, calidad postcosecha.

**SUMMARY**

The ilama fruit or papausa (*Annona diversifolia* Saff.) has high commercialization potential, but this is limited due to its high perishability, edible maturity at harvesting, and its responses to technologies focused to extend shelf life are unknown. The objective of the work was to evaluate the effect of using modified atmospheres (MA) on the postharvest quality of ilama fruits at ripe maturity stored at 20 °C. Two treatments were evaluated during a period of 9 d: storage in MA with low density polyethylene of 33 mm thickness, and storage in natural air (NA). Fruits of MA had 91 % less weight loss and higher firmness values (1.2 N) than those of NA. The respiratory activity had an average value of 97.1 mL kg<sup>-1</sup> h<sup>-1</sup>, without difference between treatments. There was not difference either in contents of acidity, total soluble solids and total sugars, whose average values were 0.20 %, 17.9 °Brix and 17.6 %, respectively. However, reducing sugars content, which varied between 4 and 10 %, had the highest values in material handled in MA. The modified atmosphere proved to be useful for reducing weight losses and softening rate of ilama fruits, thus allowing longer postharvest storage periods.

**Index words:** *Annona diversifolia*, papausa, modified atmospheres, postharvest quality.